

Anmerkungen zu den Videos der Vorlesung 7

Eigenschaften diagonalisierbarer Gruppen

Tafel 1 (12:13 - 174,2 MB)

Zeit	Gegenstand	problematischer Text -> Korrektur

Tafel 2 (14:09 - 213,9 MB)

Zeit	Gegenstand	problematischer Text -> Korrektur

Tafel 3 (14:28 - 206,5 MB)

Zeit	Gegenstand	problematischer Text -> Korrektur
2:12	Ende der letzten Zeile	... zusammenhängen affine algebraische -> ... zusammenhängende affine algebraische
5:36	Anfang der vorletzten Zeile	für welchen die -> für welche die
12:07	Mitte der letzten Zeile	..., $\chi \in X^*(G)$ bilden ... -> ..., $\chi \in X^*(G)$, bilden ...

Tafel 4 (14:40 - 224,7 MB)

Zeit	Gegenstand	problematischer Text -> Korrektur
2:07	Anfang der letzten Zeile	Für jedes fest t ... -> Für jedes feste t ...
2.13 - 2:24	letzter gesprochener Satze	Das bedeutet, diese Koeffizienten müssen mit einer Ausnahme Null sein und an einer Stelle steht hier gerade Null. -> Das bedeutet, diese Koeffizienten müssen mit einer Ausnahme Null sein und an einer Stelle steht hier gerade Eins.
3:25	letzte Zeile	für genau ein $\chi \in X^*(G)$. -> für genau ein $\chi \in X^*(G)$ eintritt.
3:42	Ende der letzten Zeile	Die regulären Funktion -> Die regulären Funktionen
9:08	Ende der letzten Zeile	... nicht von t. -> ... nicht von t ab.

Tafel 5 (9:37 - 129,9 MB)

Zeit	Gegenstand	problematischer Text -> Korrektur
0:15	rot geschriebener	2.9 B: Definition

Text ->
2.9 A: Definition

Tafel 6 (15:12 - 208 MB)

Zeit	Gegenstand	problematischer Text -> Korrektur
3:50	Ende der letzten Zeile (links)	$\dots x_i(qpq^{-1}) = x_i(p) \text{ für } q \in H \}$ -> $\dots x_i(qpq^{-1}) = x_i(p) \text{ für } q \in H \text{ und } i = 1, \dots, n \}$
4:42	Ende der letzten Zeile	$\dots x_i(\sigma_q(p) = x_i(p) \text{ für } q \in H \}$ -> $\dots x_i(\sigma_q(p) = x_i(p) \text{ für } q \in H \text{ und } i = 1, \dots, n \}$
5:03	letzte Zeile	$(\sigma_q^*(x_i) - x_i)(p)$ -> $(\sigma_q^*(x_i) - x_i)(p) = 0$
7:45	gesprochener Satz	Die zwei Gleichheitszeichen ersetze ich durch zwei Inklusionen.
7:51		-> Das Gleichheitszeichen ersetze ich durch zwei Inklusionen.
9:29	Ende der letzten Zeile	$\dots f_i(x^{-1}hx) = 0 \text{ für } h \in H \}$ -> $\dots f_i(x^{-1}hx) = 0 \text{ für } h \in H \text{ und } i = 1, \dots, m \}$

Tafel 7 (10:24 -)

Zeit	Gegenstand	problematischer Text -> Korrektur
0:16	Ende des	Wir wollen nämlich die Beziehung zwischen den beiden
-	gesprochenen	in dem Fall, daß beide Gruppen, um die es hier geht
0:26	Satzes	diagonalisierbar sind
		-> Wir wollen nämlich die Beziehung zwischen den beiden in dem Fall, daß beide Gruppen, um die es hier geht diagonalisierbar sind, beschreiben.
